

Monurelle Plus



Per il controllo e la prevenzione della cistite

Uso previsto

Monurelle Plus è indicato per il controllo e la prevenzione delle infezioni del tratto urinario (cistiti) causate da agenti patogeni quali l'*E-coli* e altri batteri gram-negativi normalmente implicati nell'eziologia delle infezioni urologiche.

Il composto a base di Xiloglucano (Emicellulosa) e Gelatina svolge un'azione meccanica nel lume intestinale impedendo il contatto degli agenti patogeni con la mucosa intestinale, che è la prima fase per la loro proliferazione e il passaggio seguente al tratto urinario.

Monurelle Plus deve essere assunto per via orale quando insorgono i primi disturbi del tratto urinario allo scopo di ridurre la proliferazione dei patogeni che può degenerare in infezioni. In caso di infezioni ricorrenti, Monurelle Plus è anche utile a prevenire nuovi episodi, nei quali la proliferazione del patogeno causa le infezioni ripetute del tratto urinario.

Forma farmaceutica e confezione

Astuccio contenente 15 o 30 capsule.

Composizione

Ciascuna capsula contiene: 100 mg di Xiloglucano, 50 mg di Gelatina (origine suina), 100 mg di Propoli, 100 mg di *Hibiscus sabdariffa*, Biossido di Silicio, Magnesio Stearato (origine vegetale) e Amido di Mais.

Istruzioni per l'uso

Ingerire la capsula con liquidi.

Dosaggio

Nei pazienti che sviluppano i primi sintomi di disturbi urinari, Monurelle Plus deve essere assunto per via orale due volte al giorno (1 capsula ogni 12 ore) per 5 giorni.

Per prevenire la comparsa di recidive prendere una capsula al giorno per almeno 15 giorni consecutivi al mese. Se necessario, è possibile ripetere il trattamento.

Avvertenze

- La diagnosi di infezione del tratto urinario deve essere eseguita da un medico. Se i sintomi persistono per più di 5 giorni, consultare il proprio medico.
- Una infezione acuta delle vie urinarie può richiedere il trattamento con antibiotico. Questo prodotto non possiede proprietà battericida o batteriostatiche e, quindi, non può sostituire il trattamento antibiotico. Tuttavia, Monurelle Plus può essere assunto in concomitanza con l'antibiotico.
- Si raccomanda di non usare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento, salvo diversa indicazione da parte di un professionista sanitario.
- Non assumere il prodotto dopo la data di scadenza stampata sulla confezione.
- Non assumere il prodotto se il blister è aperto o danneggiato.
- Non conservare sopra i 25°C. Non congelare.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Controindicazioni

Monurelle Plus non può essere usato in pazienti con ipersensibilità nota allo Xiloglucano, alla Gelatina o ad altri eccipienti del prodotto.

NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcellona - Spagna

Distributore :
Zambon Italia S.r.l
via Lillo del Duca, 10
20091 Bresso-(Mi)-Italia

0373

Rev.04: 01.09.2019